

Antwoorden op meest gestelde vragen

- Wanneer er zenuwen behandeld worden dan mag u gedurende de rest van de dag niet actief aan het verkeer deelnemen.
- Bij injecties in gewrichten en pezen kunt u normaal gesproken zelfstandig naar huis rijden. Twijfelt u zelf hieraan dan is het verstandig om een chauffeur mee te nemen.
- Lichte activiteiten mogen de dag na de behandeling weer herstart worden zoals bijv een korte wandeling. Is het beleid anders dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.
- Lichte werkzaamheden kunnen vaak direct na de behandeling gestart worden. Doet u zwaar fysiek werk dan is het raadzaam om hier rekening mee te houden. Overleg zonnodig met uw eigen arbo-arts of leidinggevende.
- De pleister(s) en roze desinfectans kan u bij thuiskomst of 's avonds verwijderen
- U kunt de eerste dagen tot 2-3 weken last hebben van napijn of de pijn kan tijdelijk verergeren. Dit verdwijnt vrijwel altijd vanzelf. U kunt hiervoor eventueel een pijnstillert innemen (bv. Paracetamol volgens bijsluitert)
- Alle pijnmedicatie kunt u blijven innemen, zoals u voor de behandeling deed. Indien u duidelijke pijnmindert ervaart, dan pas kan u gaan afbouwen met pijnmedicatie.
- Herstarten van bloedverdunners als Marcoumar en Acenocoumarol (sintromitis), gaat in overleg met de trombosedienst.
- Corticosteroiden kunnen de volgende, kortdurende, bijwerkingen geven: verhoogde suikerspiegel, verhoogde bloeddruk, rood gelaat, hoofdpijn, opvliegers, menstruatie stoornissen en verminderde betrouwbaarheid van anticonceptie.